

Die therapeutische Verwendung
des
Vaselins.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
unter dem Präsidium
des
Herrn Professor Dr. Franz Seitz
der
medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
zu München
vorgelegt
von
Anton Rest
approb. Arzt in Schrobenhausen.



München, 1881.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Die therapeutische Verwendung
des
Vaselins.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
unter dem Präsidium
des
Herrn Professor Dr. Franz Seitz

der
medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
zu München

vorgelegt

von

Anton Rest

approb. Arzt in Schrobenhausen.



München, 1881.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Das häufige Vorkommen ranzigen Fettes, welches, als Constituens bei Salben benützt, nicht selten eine Verzögerung in der Heilung oder gar einen schlechteren Ausgang eines auf der Haut lokalisirten Krankheitsprocesses mit sich brachte, mochte wohl die Veranlassung dazu abgegeben haben, nach einer Substanz zu suchen, welche die Eigenschaften des Fettes besitzend sich wie dieses zu Salben eignet, jedoch frei von jeder Säure ist, nicht ranzig wird und deshalb ein langes Aufbewahren im unveränderten Zustande gestattet. Eine solche Substanz wurde gefunden in dem jetzt immer mehr in Gebrauch kommenden Vaseline.

Das Vaseline (Vaselina) wird seit 1875 in New-York von der Chesebrough Manufacturing Company bereitet, welche Gesellschaft ihre Erfindung patentirte. In letzterer Zeit wird es auch an einigen Orten in Deutschland und England gewonnen, so namentlich bei R. H. Paulke in Leipzig. Und in neuester Zeit, das sogenannte Virginia-Vaseline von Carl Helfrich in Offenbach am Main.

Es scheinen diese später hergestellten Präparate sich von dem ursprünglichen amerikanischen Fabrikate nicht wesentlich zu unterscheiden.

Verschiedene Vergleiche lassen nur einen geringen Unterschied zu Tage treten.

Was die Herstellungsweise dieses Mineralfettes betrifft, so hat sich dieselbe im Laufe der Zeit nicht unbedeutend verändert. Während es nämlich in der ersten Zeit aus dem schlech-

ten Petroleum dargestellt wurde, gewinnt man es jetzt aus dem feinsten Petroleum dem sogenannten Luxor-oil.

Seine Gewinnung geschieht in der Weise, dafs man rohes Petroleum in einem eisernen Gefäfse erhitzt, bis die spezifisch leichteren Verbindungen verdampft sind, und im weitem Verlaufe den Rückstand so lange mit Thierkohle behandelt, bis das Filtrat möglichst farb- und geruchlos ist.

Das Vaseline ist eine Kohlewasserstoffverbindung oder vielmehr ein salbenartiges Gemisch von flüssigen und festen geruchlosen, dem Paraffin ähnlichen Kohlenwasserstoffen, mithin ein Paraffinöl; es wird von konzentrirten Säuren und Kalilauge nur sehr wenig angegriffen, konzentrirte Schwefelsäure färbt es braun. Es besitzt sehr wenig Aschebestandtheile, hat die Consistenz des weichen Schweinefettes, ist etwas zähe, von blafs-gelber Farbe, geruch- und geschmacklos, wird nicht ranzig.

Sein Schmelzpunkt ist zwischen 35° und 37° C.; das spezifische Gewicht bei 55° C. 0,840 gr. Unter dem Mikroskop läfst es eine Menge feinsten Nadeln erkennen, welche Eigenschaft jedoch nicht jedes Fabrikat zu besitzen scheint.

Es ist gänzlich unlöslich im Wasser, wenig löslich in Weingeist, leicht in Aether, Chloroform, flüchtigen und namentlich in fetten Oelen.

Seine Löslichkeit in Chloroform ist verschieden, je nachdem das Vaseline im flüssigen, heifsen Zustande dem Chloroform zugesetzt wird, oder ob es mit kaltem Vaseline gemischt wird. Kalt gemischt bedarf es 5 Theile Chloroform auf ein Theil Vaseline, bis es eine reine hellgelbe Flüssigkeit gibt. Zu heifsem Vaseline genügen 3 Theile Chloroform auf 1 Theil Vaseline. Wird die Flüssigkeit wieder kalt, so wird sie etwas körnig trüb, bleibt aber dünnflüssig.

Der grofse Vortheil, der dem Vaseline durch die Eigenschaft nicht ranzig zu werden zukommt, mufs entschieden Veranlassung sein, es den anderen sonst in der Regel verordneten Fetten und Oelen zu substituiren und es hauptsächlich bei Be-

reitung von Salben zu verwenden. Man fertigte mit Vaseline die verschiedensten Salben und constatirte nach 24 Monaten zum Erstaunen, daß keine Spur eines Geruches aufgetreten. Bis zur Zeit scheint das Vaseline nur äußerlich mehr und mehr in Anwendung zu kommen; zum innerlichen Gebrauch mangelt es noch ausgedehnter Versuche. Abgesehen davon, daß selbst das kompakte Vaseline, auf die Zunge gebracht einen wenn auch ganz schwachen (Geruch) Geschmack nach Petroleum aufweist, ist es nicht so angenehm zu nehmen wie die gewöhnlich benützten Öle oder Fette. Nimmt man z. B. Schweinefett in größerer Quantität in den Mund, so gelingt es ziemlich rasch, das Fett aus dem Munde wieder zu entfernen, während dasselbe bei Vaseline nicht gelingt. Das Vaseline bleibt vermöge seiner sehr bedeutenden Zähigkeit im Munde längere Zeit kleben, macht Lippen, Zahnfleisch, Zähne sehr schmierig und es bedarf ziemlich langer Zeit, den Mund wieder rein zu bringen. Bezüglich seiner Wirkung innerlich, läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß es in größerer Menge eingeführt Darmentleerungen rasch und sehr ergiebig bewirkt.

Von 2 Hunden, von denen jeder circa 4 Kg. wog, wurde zu ihrer Mittagskost, dem einen 10 gr Virginia Vaseline, dem andern 10 gr Axungia porci gegeben. Ebenso wurde einer Katze von 3 Kg 10 gr Vaseline gegeben. Mittags wurden die Thiere gefüttert. Alle 3 Thiere verspeisten ihre Nahrung, aus gefottener kleiner Leber und Milz bestehend, mit dem größten Appetit. Am Abend zeigte sich ein eigenthümliches Bild. Der Hund und die Katze, die Vaseline bekommen, zeigten sich im hohen Grade deprimirt; der Hund hatte kurze Zeit, nach Einnahme der Mahlzeit, bei der ihm das beigemenigte Vaseline in keiner Weise belästigend war, heftiges Erbrechen von Magenschleim, Galle und Speisetheilen. Von dem eingenommenen Vaseline war nur sehr wenig in dem Erbrochenen zu bemerken. Erst nach 6 Stunden erfolgte eine breiige Aus-

leerung, welche ganz schlüpfrig und fett glänzend erschien, bald darauf trat Diarrhöe ein, die den Magen und Darmcanal gründlich entleerte, sicherlich alles Vaseline wieder aus dem Körper entfernte. Der Hund lag die folgende Nacht über in hohem Grade erschöpft, regungslos, erholte sich gegen Morgen rasch wieder und am nächsten Tage war er wieder so frisch wie zuvor. Der Katze haben 10 gr Vaseline schon mehr übel bekommen. Auch sie hatte mit wahren Heißhunger die Nahrung verspeist ohne im geringsten an dem beigemengten Vaseline, das die Speise sehr schlüpfrig machte, Anstoß zu nehmen. Nach einer Stunde stellte sich bei ihr nach heftigem Würgen Erbrechen ein, welches namentlich eingenommene Speisetheile entleerte. Im Laufe des Nachmittags traten auch bei ihr profuse Darmentleerungen auf, die sämmtlich äußerst fett und schlüpfrig waren und einen penetranten Geruch verbreiten. So viel aus diesen Entleerungen zu sehen, hat die eingenommene Speise unverdaut fast ganz den Darm wieder verlassen. Die Katze war so sehr affizirt, daß sie regungslos liegen blieb und obwohl sehr scheu, alles mit ihr thun liefs, ohne sich zu rühren. Erst am zweiten Tage erholte sie sich wieder, nachdem sie größere Mengen warmer Milch bekommen. Der Hund, der 10 gr Schweinefett bekommen, zeigte fast gar keine Veränderung, er war fortwährend munter, hatte zwar an dem nämlichen Tage zwei Darmentleerungen, zu welchen das Schweinefett kaum Veranlassung war. Nach drei Tagen wurde der Versuch wiederholt und der nämliche Erfolg erzielt.

Ich nahm nun selbst einen kleinen Caffeelöffel voll Virginia-Vaseline (etwa 7 gr) im Laufe des Vormittags und hatte den ganzen Tag über einen faden schmierigen Mund. Es kam nicht zur Diarrhö, aber dem Magen scheint es auch nicht behagt zu haben; es erfolgte auf die Mittagskost, die aus Suppe mit ganz magerem Rindfleisch und wenig Spargel bestand, sehr intensives Aufstoßen.

Aus den wenigen Versuchen schon dürfte hervorgehen,

dafs das Vaseline, so wie es jetzt zubereitet wird, sich nicht zu innerlichem Gebrauch eignet. Es müßte noch viel feiner raffiniert demselben eine viel hellere Farbe gegeben werden können, wenn es sich innerlich eignen sollte, bei allen mir bisher vorgekommenen Sorten von Vaseline liefs sich ein wenn auch sehr schwacher so doch deutlich erkennbarer Geschmack nach Petroleum nicht verläugnen.

Da das Vaseline durch seine Haltbarkeit sich so ungemein werthvoll erwies, so wurde ich durch unseren hochverehrten Herrn Prof. Dr. Seitz veranlaßt in der medizinischen Poliklinik bei einer Reihe von Hautkrankheiten, bei denen eine Salbe angezeigt war, das Vaseline in Anwendung zu bringen und zwar theils rein, theils mit anderen Substanzen vermischt.

Von den vielen Fällen, bei denen es angewandt wurde, möchte ich nur einige wenige hier näher erörtern.

Johann Zapf, 17 Jahre alt, ein sonst gefundes, kräftiges Individuum, stand schon 14 Tage in der Poliklinik in Behandlung; derselbe hatte, wie es nach seiner Angabe scheint, ohne jede Ursache an beiden Armen etwas unter der Ellenbogenbeuge handtellergröfse geröthete nässende Hautstellen — Eczema squamosum — theils mit Epidermischuppen, theils mit eingetrockneten Eiterkrusten bedeckt. Er wurde geraume Zeit mit Unquentum e hydrarg. praecipit. alb. behandelt.

Ein sehr langfamer Erfolg war das Resultat der Behandlung. Seit vier Tagen nun wird reines Vaseline angewendet und zwar in der Weise, dafs Morgens und Abends die erkrankten Hautpartieen mit warmem Seifenwasser gereinigt und dann mit Vaseline bestrichen werden. Schon nach wenigen Tagen zeigte sich eine auffallende Besserung; die bedeutende Röthe und Schwellung der Haut verschwand sehr rasch, die Abschuppung hörte auf, die eingetrockneten Eiterkrusten fielen ab. Das den nächtlichen Schlaf raubende so quälende Jucken und Brennen liefs ganz nach. Nach einer Behandlung von

acht Tagen mit Vaseline und bloßer Reinigung mit Seifenwasser war eine vollständige Heilung eingetreten.

2. Fall, eingetreten am 17. März 1879. Weinhard Monika 56 Jahre alt, kinderlose Wittwe, gibt an, daß sie in ihrem ganzen Leben nie krank war. Bei ihrem Berufe als Wäscherin, bei welcher Beschäftigung sie sehr häufig mit ätzenden Substanzen wie mit Laugen in Berührung kommt, hat sie seit geraumer Zeit, wahrscheinlich länger schon als sechs Wochen (wie sie angibt) einen intensiven entzündlichen Prozess an der Haut beider Hände, der namentlich die Streckseite beider Vorderarme erfasste. Die Patientin wandte bis zum Eintritt in die Behandlung mehrere Salben an; dabei wechselten Verbesserungen und Verschlimmerungen ab. Sie selbst gibt als die Ursache ihres Leidens an, daß sie sich vor mehreren Jahren die Hände erfroren habe. Der Umstand aber, daß Patientin als Putzerin, Wäscherin etc. theils sehr viele Arbeiten mit kaltem und heißen Wasser in rascher Aufeinanderfolge verrichtete, theils mit der bei diesen Leuten so vielfach gebrauchten Lauge zu schaffen hat, möchte eher als die Ursache der Hauterkrankung erscheinen. Das Krankheitsbild ist das einer bedeutenden Dermatitis mit Eczema rubrum. Der Prozess, der schon ziemlich weit um sich gegriffen hat, zeigt neben Röthung und Schwellung größtentheils Abschuppung, an anderen Stellen Bläschen, die zum Theil in Folge des intensiven Juckens von der Patientin aufgekratzt sind und nässende Stellen erzeugen. Im Uebrigen ist Patientin gesund, Appetit gut, ohne Fieber, nur etwas schlaflos in Folge des so lästigen Juckens. Auch in diesem Falle wird Vaseline angewendet und sollen die erkrankten Hautpartien täglich Morgens und Abends eingerieben werden. Dabei muß aber der Patientin, was wohl sehr wichtig ist, empfohlen werden, die Hände bei ihrer täglichen Beschäftigung zu schonen, womöglich einen andern Beruf zu ergreifen.

Am 20. März wurde ein auffallend rasches Zurückgehen

des Eczems bei fortdauernd ausgezeichnet, gutem Allgemeinbefinden der Patientin konstatirt, die ödematöse Hautschwellung war gänzlich verschwunden, die dunkle Röthe sehr zurückgegangen, kein Jucken plagte die Patientin mehr. In den nächstfolgenden Tagen steigerte sich der Krankheitsprozess wieder, indem die Röthe wieder zunahm und sich neue excoriirte Stellen zeigten. Die Abschuppung ist sehr bedeutend. Aber schon am 26. März zeigte sich bei fortdauerndem Gebrauch des Vaseline die Röthe am rechten Vorderarm gänzlich verschwunden, nur noch leichte Röthe am linken Arm; trotz dieser offenbaren Besserung in dem Zustande der Patientin steigerte sich zusehends wieder das Brennen und Jucken. Bis zum 31. März verschwand auch allmählig die Abschuppung, welche nun einer gesunden Haut an vielen Stellen Platz machte. Das heftigste Jucken der Haut bestand aber fort. Es wird nun eine Vaseline-Salbe angewendet. — Vaseline 30,0 Acid. carbol. crystall. 2,0. Am 10. April zeigte sich, nachdem der Heilungsprozess schon sehr weit gediehen war, die Röthe schon verschwunden, die Abschuppung sich fast verloren hatte und überhaupt nur mehr die Hände wenig krankhafte Stellen zeigten, trotz fortgesetzter Einreibung mit Vaseline neuerdings nicht unbeträchtliche Spannung der Haut, Röthe, Schmerzhaftigkeit, Jucken an allen früher befallenen Hautstellen.

Diese Exacerbation erklärt sich aus der Angabe der Patientin, dass sie nämlich bis vor wenigen Tagen nichts gewaschen, seit 3 Tagen aber wieder ihre alte Beschäftigung aufgenommen habe. Da nun Patientin obendrein erklärte, ihre Erwerbsquelle nicht verändern zu wollen, so wäre natürlich jede weitere Behandlung nutzlos gewesen.

Der 3. Fall betrifft die 31jährige Tagelöhnerin Antonia Lindauer. Dieselbe eine kräftig gebaute Person gibt an, vor mehreren Jahren den Unterleibstyphus überstanden zu haben, soll aber sonst immer gesund gewesen sein mit regelmässig eintretenden Menfes. Vor ungefähr einem Jahre bekam Patientin

unter heftigem Brennen und Jucken einen Ausschlag im Gesicht, zu dessen Heilung sie sich damals nur einiger Abführmittel bediente. Seit dieser Zeit besteht er mit Schwankungen fort und tritt nun etwa seit 4 Wochen mit erneuter Heftigkeit auf. Die Affektion betrifft hauptsächlich Stirne und Wangen, wo sie sich in verschiedenen Entwicklungsstufen zeigt. Einzelne Hautpartieen sind dunkel geröthet, ödematös, andere zeigen stecknadelkopfgroße Bläschen die mit seröserem Inhalt gefüllt sind, während einige Stellen Abschuppung und Krüftchen erkennen lassen. Diese Erscheinungen deuten auf ein Eczema rubrum. Das Allgemeinbefinden der Patientin ist dabei ein vortrefflicher Appetit, Schlaf gut, keine Temperaturerhöhung zu bemerken. Es wird der Patientin nun am 20. März empfohlen, die erkrankten Hautstellen täglich zweimal mit Seifenwasser zu waschen und nach gehöriger Abtrocknung dieselben mit reinem Vaseline zu bestreichen. Schon am 22. März zeigt sich bedeutende Besserung, die Röthe und Spannung im Gesicht ist bedeutend zurückgegangen, das lästige Jucken hat rasch abgenommen, so daß die Patientin sich nach langer Zeit wieder eines gefunden Schlafes erfreute. Am 26. März sind fast alle Krankheitsercheinungen verschwunden, von Jucken keine Spur mehr, die wenigen noch vorhandenen Krusten werden durch fortgesetztes Waschen mit Einreibung von Vaseline vollständig entfernt. Am 30. März war Patientin geheilt.

Ein weiterer Fall betrifft Maria Falkenstein. Dieselbe ist 32 Jahre alt, verheirathet, ohne Kinder, erfreut sich nach ihrer Angabe, während ihres ganzen Lebens der besten Gesundheit. Vor 8 Jahren hatte sie ein Geschwür an den äußern Genitalien. Sie machte damals Umschläge mit einer (nach ihrer Angabe wahrscheinlich) leicht adstringirenden Lösung. Das Geschwür heilte darauf sehr bald. In letzter Zeit plagte sporadisch auftretendes Kopfweh die Patientin und dieses wurde durch Morph. bekämpft. Nachdem dieselbe schon einige Zeit

in der chirurg. Poliklinik behandelt wurde, kam sie am 30. März in die mediz. Poliklinik zur weitem Behandlung. Seit etwa einem Jahre klagt die Patientin über heftige Schmerzen verbunden mit Brennen und Jucken, welche ihr große Geschwüre an beiden Unterschenkeln verursachten. Der Zustand der Geschwüre verschlimmert sich zusehends namentlich im Verlaufe des letzten Monates. Die Geschwüre von der Größe eines Markstückes haben bereits tief hinein das Gewebe zerstört, erscheinen mit scharf abgegrenzten speckigen bläulichen Rändern und zeigen durchgehends mit schlechtem Eiter bedeckt, keine Tendenz zur Heilung.

Als Ursache dieses Leidens ergibt sich wohl fast mit Bestimmtheit Syphilis. Andere Erscheinungen von Lues waren früher außer dem schnell verheilten Geschwür an den Genitalien nicht da und lassen sich auch bei dem gegenwärtigen Zustande nicht wahrnehmen, will man nicht die bohrenden Kopfschmerzen in der Stirngegend als Anfangsstadium einer an dieser Stelle auftretenden Periostitis in Folge von Syphilis betrachten. Im Uebrigen ist das Befinden der Patientin ein ziemlich gutes, Appetit, Schlaf gut, regelmässigen Stuhl, Menses in der Ordnung.

Die Behandlung besteht in der Darreichung von Quecksilber als Hydrargyrum iodatum flavum innerlich und in der Anwendung einer Salbe äußerlich nämlich Vaseline 25,0 mit Acid. boric. 2,0. Mit dieser Salbe soll die Patientin, nachdem sie alles Eitriges mit lauem Seifenwasser entfernt hat, die Geschwüre verbinden. Schon nach Verlauf von drei Tagen sahen die Geschwüre sehr viel besser aus. Es bilden sich unter der schützenden und zugleich desinfizierenden Decke gute Granulationen, die Geschwürsränder nahmen eine röthliche hellere Färbung an. Nach sechs Tagen bekam Patientin neuerdings eine Salbe von der nämlichen Zusammensetzung und setzte den Verband in der ihr empfohlenen Weise fort. Das Allgemeinbefinden war fortwährend ein ganz zufriedenstellendes. Die

Schmerzen hatten vollkommen nachgelassen. Schon nach vierzehn Tagen war die Besserung so weit fortgeschritten, daß die Geschwüre nur mehr den halben Umfang hatten und von der Tiefe her durch neugebildetes granulirendes Gewebe sich auszufüllen begannen. Es wäre dann auch sicherlich vollständige Heilung zu Stande gekommen, allein Patientin war, wie es schien, mit dem Erfolge schon zufrieden und verschwand aus der Behandlung, ohne sich später einmal wieder sehen zu lassen.

5. Fall. Söllner Josefa, 46 Jahre alt, Tagelöhners Wittwe war nach ihrer Aussage nie krank. Die Menfes traten immer regelmäfsig ein, seit drei Monaten sollen sie jedoch cessirt sein. J. S., ein sonst kräftig gebautes, gefundes Individuum, suchte um Hilfe wegen eines sie heftig juckenden schmerzhaften Eczems das vor etwa einem Monat fast plötzlich und mit grofser Heftigkeit aufgetreten sein soll. Dieses Eczem ergriff die ganze beharrte Kopfhaut und verbreitete sich auch auf der Stirne aus; auch bei diesem Ausschlag zeigen sich alle Stadien des Eczems. Besonders viel nässende Stellen zeigen sich, von dem unausgesetzten Kratzen herrührend. Die Behandlung der Patientin wird eingeleitet mit einem radikalen Abschneiden der Haare und Reinigung der erkrankten Hautstellen mit Sapo domestic.

Hierauf wird täglich Morgens und Abends Vaseline aufgestrichen. Nach drei Tagen ist bedeutende Besserung bemerklich. Nach Verlauf von weiteren drei Tagen war bei fortdauernd gutem Allgemeinbefinden der Patientin schon die Hälfte der erkrankten Kopfschwarte geheilt. Am zehnten Tage steigerte sich ganz unerwartet das Eczema neuerdings in Folge der unterlassenen Waschungen. Die Patientin wird nun gehalten den Kopf täglich zweimal zu waschen und gründlich zu reinigen und jedesmal, nachdem die erkrankten Hautstellen gut getrocknet waren, mit Vaseline einzureiben. Nach nur wenigen Tagen zeigte sich schon bedeutende Besserung; nur am

Haarkranz haftete das Eczem mit gröfserer Hartnäckigkeit. Nach Verlauf von weiteren acht Tagen war das Eczem vollständig geheilt, die Patientin aus der Behandlung mit dem besten Erfolge entlassen.

Der 6. Fall betrifft Jakob Steinbach, 21 Jahre alt, derselbe war noch nie krank, von kräftiger Constitution. Er leidet seit drei Tagen an heftigem Catarrh der Nasenschleimhaut und bekam vor Kurzem ein Eczem um die Nasenspitze herum, das den Patienten äufserst schmerzte, trotz der ganz geringen Ausdehnung.

Nur das so heftige Brennen und Jucken der Haut veranlafste ihn, in Behandlung zu treten. Das Allgemeinbefinden des Patienten ist dabei ein vortreffliches. Derselbe wird angewiesen, täglich Morgens und Abends die erkrankten Hautpartieen mit warmem Seifenwasser zu waschen und möglichst zu reinigen und hierauf mit Vaseline einzureiben; das Eczema das nur wenig Krüftchen gebildet hatte zeigte schon nach zwei Tagen vielfach Besserung. Die Krusten waren bis auf Spuren abgefallen. Die übrigen Hautstellen, die von dem Eczem befallen, nur mehr schwach geröthet. Dieser Zustand erforderte eine weitere Behandlung nicht mehr und trat deshalb Jakob Steinbach geheilt aus der Behandlung.

7. Fall. Wegner Carl, 27 Jahre alt, Bäcker. Dieser leidet seit etwa 5 Wochen an einem sehr umfangreichen Eczema (rubrum) squamosum, das die vordere Hälfte des Halses ergriffen hatte und sich von hier aus weiter verbreitete rechterseits über die Wange, über den äufsern Augenwinkel auf die rechte Stirnhälfte bis zur behaarten Kopfhaut, linkerseits aber nur die Wange ergriffen hatte. Patient wurde einige Zeit im Spital behandelt, trat aber etwas gebessert wieder aus. Neuerdings auftretende Exacerbationen veranlassen denselben, wieder ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bei seinem Eintritt in die Behandlung zeigen sich die verschiedenen Variationen des Eczems. Am Halse zeigten sich Krusten,

über die Wangen waren Bläschen theils mit eitrigem theils mit serösen Inhalt gefüllt, während an der Stirne das Eczem sich erst in seinen Anfängen zeigte. Alle befallenen Hautpartieen waren intensiv geröthet und nicht unbeträchtlich geschwellt. Bei der bedeutenden Ausdehnung dieses Eczem scheint Patient sogar von leichtem Fieber befallen, begleitet von den heftigsten Schmerzen, die den Patienten bald schlaflos machten. Dabei war der Appetit wenig, Ausleerung regelmässig. Auch dieser Fall wird wie die vorgehenden behandelt. Patient soll alle kranken Stellen Morgens und Abends mit lauem Seifenwasser recht rein waschen und hierauf mit reinem Vasclin einreiben. Die Erkrankung der linken Wange ging nach sechs Tagen fast ganz zurück, auf der rechten Wange schien sie hartnäckiger zu sitzen. Nach Verlauf von weiteren zwei Tagen (also acht Tagen) war auch rechts schon bedeutende Besserung bemerklich. Die Krusten am Halse fielen ab, die Bläschen auf der Wange trockneten sehr rasch ein und machten einer bläulich lividen Färbung der Haut Platz; nur noch wenig nässende Stellen waren auf der Stirne vorhanden. In den nächsten drei Tagen war alle Schwellung der Haut, das heftige Brennen und Jucken vollständig verschwunden, die noch spärlich vorhandenen Krusten dem Abfallen nahe. Das Allgemeinbefinden des Patienten ist wieder normal, das Fieber verschwunden, Appetit stellte sich wieder ein und Patientin erfreute sich eines seit langer Zeit gewichenen gefunden Schlafes.

8. Fall. Therese Göttler, 60 Jahre alt, verheirathete Tagelöhnersfrau. Dieselbe ein schwach gebautes, schlecht genährtes Individuum gibt an, die Kinderblattern überstanden zu haben; hierauf will sie immer gesund gewesen sein. Vor einigen Jahren jedoch soll ein Hautauschlag aufgetreten sein, dem Patientin wenig Beachtung schenkte, der aber in letzter Zeit sich sehr steigerte und die Patientin mit wenig kurz dauernden Unterbrechungen äusserst schmerzte. Bei näherem Zusehen

zeigt sich theilweise Eczema spumofum theils vericulosum. Im Sommer soll die Affektion gesteigert auftreten. Patientin selbst meint, daß sie ihr letztes Kind zu lange gestillt habe, woraus sie die Ursache des sie so quälenden Ausschlages zu finden glaubt. Nach ihrer stets schwankenden Aussage hatte derselbe schon alle Körperstellen nach einander erfaßt und verursachte ihr die heftigsten Schmerzen. Zur Zeit, als Patientin in Behandlung tritt, ist die Affektion gerade sehr stark entwickelt, namentlich an den Vorderarmen und im Gesicht als thalergroße, rothe Flecke, welche neben einer bläulich lividen Färbung der Haut auch eine beträchtliche Infiltration derselben erkennen lassen. Das Allgemeinbefinden der Patientin ist bei geringem Appetit und der vorhandenen Schlaflosigkeit ein gestörtes. Sie macht den Eindruck einer hysterischen Person.

Bei diesen Krankheitsercheinungen wird ebenfalls Vaseline angewendet und zwar mit Salizylsäure (2,0:25,0). Patient wird angewiesen jedesmal Morgens und Abends die erkrankten Hautpartien zu reinigen und mit dieser Salbe einzureiben. Nach Verlauf von acht Tagen war eine wesentliche Besserung zu bemerken. Die Schmerzen waren ganz verschwunden, die meisten befallenen Stellen abgeblaßt, ein gesunder Schlaf erquickte die Patientin wieder.

Am zwölften Tage, nachdem sie in Behandlung getreten, war nur mehr ein rother Fleck zu bemerken und wurde ihr nur noch einmal eine Salbe verordnet, mit der sie aus der Behandlung verschwand.

9. Frau Sch. 52 Jahre alt, an Cholelithiasis leidend und öfter von Schmerzen in der Gegend der Gallenblase und Verdauungsbeschwerden geplagt, suchte im Frühling 1880 Rath gegen ein Eczem an den Lippen. Dasselbe verbreitete sich einen Centimeter über beide Lippen hinaus auf die Umgebung des Mundes und war mit lästigen Jucken verknüpft. Die Kranke suchte letzteres durch Umschläge von kaltem Wasser

und Bleiwasser zu mildern. Die Pustelchen trockneten bei dem Gebrauche des letzteren ein und fielen ab. Das Exanthem jedoch kehrte nach einiger Zeit wieder. Eine hierauf angewendete Salbe von Hydr. praecip. alb. wurde nicht gut vertragen, auch Umschläge von Bor säurelösung hatten nicht den gewünschten Erfolg. Das Exanthem kehrte mit dem lästigen Gefühl von Jucken und Brennen immer wieder bis es nach einer Dauer von mehr als zwölf Monaten auf Bestreichen mit Vaseline in wenigen Tagen abheilte und seit dieser Zeit wegblieb.

10. Von gutem Erfolge erwies sich das Vaseline als Condituens zur Bor salbe in einem Falle von Verbrennung mit brennendem Weingeist am rechten Unterschenkel einer 25jährigen blutarmen Frau. Dieselbe hatte zwei umfängliche Blasen zur Folge, die nach ihrer Ablösung torpide Verschwärungen eine von 4 Centimeter Länge und 2 Centimeter Breite, die zweite etwas tiefer unten von etwas geringerem Umfang zurückliessen. Die Verbrennung war zuerst mit Kälte, dann aber, als die Eiterung fortschritt, mit feuchtwarmen Umschlägen behandelt worden. Innerlich erhielt die schwächliche blutarme Frau ein Eisenpräparat in Tropfenform. Die reichliche Eiterabsonderung ohne Bildung von Granulationen bestand auch nachdem an Stelle des warmen Wassers ein Chamillen-Infusum zu Umschlägen benützt worden war, drei Wochen lang fort, die Geschwürsfläche nahm durchaus nicht an Umfang ab und zeigte blasse, schlaffe Ränder bis am Beginn der vierten Woche eine Salbe von Acid. boric. 5,0 auf 50,0 Vaseline zum Verband verordnet wurde. Schon nach zwei Tagen boten die Geschwüre ein frischeres Aussehen, bedeckten sich mit Granulationen und sonderten weniger und besseren Eiter ab.

Wenige Tage später hörte die Eiterung auf und schritt dann die Vernarbung rasch fort, so dass die Kranke acht Tage nach der begonnenen Anwendung der Salbe völlig geheilt war.

Im Laufe meiner Praxis wurden nun eine große Reihe von Hauterkrankungen theils mit reinem Vaseline, theils in Mischung mit Bor- oder Carbolsäure, mit Jod- und Jodtinktur, behandelt, von denen einige im Folgendem beschrieben werden:

A. H., $\frac{1}{2}$ Jahr alt, ist ein sehr kräftig gebautes Mädchen, das sich bis zur Zeit des Impfens immer im besten Wohlfühlen befand. Kurze Zeit nach dem Impfen, als an den Armen sich die Impfpusteln zeigten und mit serösen Inhalte füllten, bekam das Mädchen ein sehr heftiges Eczem mit einer großen Anzahl von Bläschen im Gesicht, begleitet von bedeutender Röthe und Schwellung, namentlich um die Augenlider. Die behaarte Kopfhaut blieb vollständig frei. Heftiges Schreien und fortwährende Unruhe des kleinen Patienten bekundeten, dass derselbe ziemlich von Schmerzen gequält wurde. Es wurde nun Virginia-Vaseline mit Carbolsäure angewendet und zwar im Verhältniss von 20 : 1. Das Kind musste zuerst mit lauwarmem Seifenwasser gereinigt werden, damit namentlich das aus den Bläschen ausgeflossene und theilweise eingetrocknete Serum entfernt wurde; sodann wurde das Gesicht gut abgetrocknet und mit dieser Carbol-Vaseline-Salbe bestrichen. Diese Prozedur wurde täglich zweimal vorgenommen.

Nach zweitägigem Gebrauch zeigte sich eine sehr erfreuliche Besserung. Alle Bläschen waren zu Krusten eingetrocknet, mehr als die Hälfte schon dem Abfallen nahe, nur die Haut noch intensiv geröthet. Am fünften Tage der Behandlung liefsen sich nach dem Waschen alle Eiterkrusten gänzlich entfernen; auch die Haut fing an, theilweise abzulassen. Vom sechsten Tage an wurde nun nur einmal Morgens das Gesicht sorgfältig gewaschen und nur mehr mit reinem Vaseline bestrichen. Am zehnten Tage war eine vollständige Genesung eingetreten und die Haut im Gesichte so zart und mild wie sie vorher nicht gewesen.

G. S., 1 Jahr alt, nicht besonders kräftig gebautes Kind, leidet schon seit Monaten an einem Magen-Darmkatarrh in

Folge der theilweise schlechten, theilweise unzweckmäfsig gewählten Ernährung. Die fortwährende Diarrhoe brachte das Kind ziemlich herunter und bewirkte, dafs die Bauchdecken ganz schlaff, wie Leder sich anfühlten. In diesem Zustande wurde das Kind von einem Eczem befallen, das zuerst am Hals und oberhalb des linken Schlüsselbeines auftrat. Wie in der Regel geschieht, wurde von den Eltern des Kindes eine ganze Serie von Fetten und Oelen benützt, was jedoch die rasche Ausbreitung über das Gesicht und selbst über die Scheitelgegend keineswegs zu hindern vermochte. Nach sieben-tägigem Bestande erst wurde ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Es zeigte sich ein Eczema rubrum der heftigsten Art. Das Gesicht war ganz übersät mit frischen Bläschen. Das durch Kratzen fortwährend auslaufende Serum brachte die Haut zur höchsten Entzündung und verursachte eine sehr beträchtliche Schwellung des ganzen Gesichtes, welche sich so sehr steigerte, dafs dem Kinde das Sehen dadurch erschwert war.

Am Halse zeigten sich mehr oder minder grosse Krusten von eingetrocknetem Serum und Eiter; die Haut war auch hier intensiv geröthet. Die Hautaffektion an der Scheitelgegend war erst im Beginne, Bläschen fanden sich hier nur vereinzelt vor. Diese Erkrankung einer so ausgedehnten Hautpartie im Vereine mit dem Katarrh der Verdauungswege machten das Kind bedenklich krank.

Es wurde nun das Kind jeden Morgen und Abend mit lauwarmem Chamillenthee an allen erkrankten Hautstellen aufs sorgfältigste gewaschen und gereinigt und hierauf mit einer Vaselinefalte bestrichen. (Vaselin 25,0, acid. bor. 4,0). Nach Verlauf von 24 Stunden schien nun sogar die Entzündung der Haut eher zugenommen zu haben; am dritten Tage aber konnte man schon eine wesentliche Besserung sehen, da die Schwellung im Gesicht gänzlich verschwunden war. Am vierten Tage begannen die Krusten schon in grossen Massen abzufallen

und die stark geröthete Haut wurde etwas bläulich; auch der heftige Schmerz mußte gewichen sein, da das Kind seit vierzehn Tagen zum ersten Male die Nacht vom vierten zum fünften Tage ruhig schlief. Vom sechsten Tage an ging der ganze Krankheitsprozeß rasch der Heilung entgegen. Bis zum achten Tage waren alle Krusten abgefallen, die Haut überall glatt und weich und einzelne schwach röthlich gefärbte Stellen waren noch zurückgeblieben, die sich in wenigen Tagen ohne jede Behandlung von selbst verloren. Es dürfte gerade in diesem Falle, wo das Eczema eine so beträchtliche Ausdehnung errang und die Temperatur der Haut entschieden gesteigert war, eine so auffallend rasche Heilung mit einer Salbe aus Schweinefett oder einem andern der Zerfetzung rasch anheimfallenden Fette oder Oele sicherlich nicht erzielt worden sein.

Auch bei einer ältern Frau, H. V., kam Vaseline in Anwendung in Verbindung mit Carbonsäure. Dieselbe ist seit vielen Jahren mit Krampfadern behaftet, welche schon seit einem Jahre durch colossale Blutstauungen an den Füßen bedeutende Geschwulst verursachten. Vor einigen Wochen kam es nun gar zu Nekrotisirung kleiner Hautflecke und oberflächlicher Geschwürsbildung. — Als die Frau in Behandlung trat, befanden sich am rechten Unterschenkel zwei Geschwüre von der Größe eines Markstücks. Der Geschwürsgrund war mit ehmierigem Eiter bedeckt. Die Ränder etwas gewulstet, mit bläulich livider Färbung. Sie bekam nun eine Salbe von Vaseline (Vaseline 30,0, acid. carbol. 4,0), mit der sie Morgens und Abends die vorher mit Chamillenthee gereinigten Geschwüre bedecken sollte. Es war erstaunlich, wie nach wenigen Tagen die Geschwüre sich reinigten und sofort Tendenz zur Heilung zeigten. Nach acht Tagen war der Geschwürsgrund nahezu ausgefüllt, die Ränder rosa gefärbt, kaum eine Spur von Eiter mehr zu sehen. Da aber die Ursache des Leidens, die Krampfadern und die dadurch bedingten Stauungen nicht beseitigt werden konnten,

so liefs sich natürlich auch nur eine wesentliche Besserung erzielen.

Bei einem Erysipelas an beiden Oberarmen fand ebenfalls reines Vafelin Anwendung; das Rothlauf verbreitete sich von den Impfpusteln an beiden Armen bis zur Schulterhöhe, abwärts bis in die Mitte des Vorderarmes. Die Impfpusteln waren sehr grofs mit einer Menge von Sekret. Das Kind, von äufserst kräftiger Constitution, hörte zu essen auf, schrie fortwährend, fieberte. Es wurden nun beide Aermchen Morgens und Abends mit etwas Chamillen-Infusum gewaschen, gut getrocknet und mit Virginia-Vafelin bestrichen; schon nach 24 Stunden war die Röthe und Schwellung nicht mehr so intensiv, der Schmerz schien sehr abgenommen zu haben, da das Kind nun seit vier Tagen zum ersten Male wieder schlief. Nach drei Tagen bildeten sich ganz schöne, trockene Krüstchen. Das Rothlauf an beiden Armen war nahezu am vierten Tage der Behandlung gänzlich verschwunden, das Kind wieder so wohl, wie vor der Erkrankung.

Bei einer Pemphigus-Erkrankung an der Hand des I. B., 48 Jahre alt, wurde das Vafelin angewendet mit Borfäure (1,0 : 5,0 Vafelin). I. B. war immer gesund, bekam ohne jede Veranlassung am Rücken der linken Hand eine Blase; dieselbe bildete sich rasch aus und zeigte die Gröfse eines Markstückes; Patient schnitt nun die Blase ganz weg und es erschien ein Geschwürsgrund mit dünnem Eiter bedeckt. Die Geschwürsränder wulsteten sich mehr und mehr und da es an frischen Granulationen fehlte, erschien der Geschwürsgrund beträchtlich vertieft. Nachdem Patient verschiedene Hausmittel angewendet, trat er in Behandlung und bekam nun eine Salbe mit Vafelin (Vafelin 25,0 acid. borric. 5,0). Die erkrankte Partie sollte zuerst mit etwas Seifenwasser gereinigt und hernach mit dieser Salbe bestrichen werden. Nach drei Tagen schon sah das Geschwür sehr viel frischer aus, es bildeten sich Granulationen von der Tiefe her, die gewulsteten Ränder wurden allmählig

glatter und die Geschwürsfläche füllte sich von der Tiefe her aus. Nach acht Tagen war die Stelle der übrigen Haut glatt nur eine kleine Partie nässte noch wenig. Auch dies hörte nach zwei Tagen auf und zeigte sich nur mehr ein rother Fleck von der Ausdehnung der ursprünglich entstandenen Blase.

Im vergangenen Sommer wurde ich zu einem Manne gerufen, dem in einer Dreschmaschine der rechte Arm ausgerissen wurde. Es musste die Amputation vorgenommen werden, bei der vom Humerus ein höchstens 6cm. langes Stück noch zurückblieb. Nach der Operation wurde mit der denkbar grössten Genauigkeit Alles unterbunden, was nur einen Tropfen Blut durchtreten liess; hierauf die ganze Wundfläche mit 8procentiger Chlorzinklösung geätzt, die Hautlappen vereinigt und mit Tüchern, die in 5procentiges Carbolwasser getaucht waren, auf's Sorgfältigste verbunden. Die grosse Entfernung liess einen täglichen Besuch nicht zu. Ich musste das Ausputzen der Wunde sowie das Verbinden jeden zweiten Tag einer gänzlich unkundigen Hand überlassen. Die Heilung ging jedoch ausserordentlich rasch vor sich. Erst nach vier Tagen zeigten sich geringe Spuren guten Eiters. Nachdem durch eine Einspritzung von 6procentiger Chlorzinklösung, jede Eiterung zu sistiren gelungen war, wurde nach 3 Wochen von Verbänden mit Carbolwasser gänzlich Abstand genommen und die sehr schön vereinigten Wundränder blos mit Carbol-Vaselin (Vaselin 50,0 acid. carbol. 4,0) bestrichen, ebenso ein Streifen Leintuch mit dieser Salbe bestrichen und darüber gelegt. Nach weiteren vierzehn Tagen war der Amputationsstumpf (nach 5 Wochen Behandlung) vollständig in keineswegs günstigen Verhältnissen geheilt. In jüngster Zeit konnte ich noch einen Fall beobachten, bei einem anscheinend gefunden Mann, im Alter von 32 Jahren, bei dem ebenfalls Vaselin versucht wurde. Derselbe hatte an beiden Unterschenkeln Geschwüre, am rechten vier von beträchtlicher Ausdehnung. Dieselben zeigten durchaus keine Tendenz zur Heilung, sahen torpid

aus, mit dünnem, flüssigen, schlechten Eiter bedeckt. Auch von Zeit zu Zeit beträchtlicher Schmerz macht sich bemerkbar. Die Anamnese ergibt keine positiven Anhaltspunkte über die Entstehung der Geschwüre; ihr Aussehen aber macht sie auf Syphilis suspect. Es werden nun jeden Tag Reinigungen mit Chamillen-Infusum vorgeschlagen und darauf eine Salbe von Carbol-Vafelin (25,0 Vafelin 3,0 acid. carbol.). Anfangs reizte die Salbe etwas, was aber zur Folge hatte, daß der Geschwürsgrund sehr bald frischer sich zeigte und das Geschwür sich mit gefunden Granulationen zu füllen begann. Im Verlauf von acht Tagen war eine Heilung eingetreten; jedoch schon in den nächsten Tagen ein neuer Aufbruch der Geschwüre zu constatiren. Nun erst wurde auch innerlich verordnet und zwar Hydrag. jodat. flav. (Hydrag. jodat. flav. 1,0 pur 0,1 Succ. et Pulv. Liquirit. qu. s. ut. f. Pil. Nro. XX jeden Tag zwei Pillen zu nehmen). Zudem wurde äußerlich die zuerst schon verordnete Salbe angewendet und im Verlauf von zwanzig Tagen die Heilung erzielt. Nachdem schon einige Zeit verstrichen, scheint auch ein neues Aufbrechen nicht mehr zu befürchten sein.

Bei einer Reihe von Scharlacherkrankungen wurde im Desquamationsstadium reines Virginia-Vafelin zur Anwendung gebracht, namentlich dann, wenn die Kranken ein lästiges Jucken und Beissen plagte. Die Einreibungen erwiesen sich als äußerst wohlthuend. Die Spannung der Haut, das quälende Jucken, das die Kranken zum fortgesetzten Kratzen veranlaßte, liefs sehr bald nach; es scheint auch als ob in den Fällen, wo die Haut Morgens und Abends mit Vafelin bestrichen wurde, die Abschuppung sich rascher vollendete.

Bei Phtisis pulmorum werden auch manchmal Einreibungen von Speck oder von Schweinefett empfohlen; auch in solchen Fällen wurde das Vafelin versucht an mehreren Personen mit ausgesprochener Lungenschwindfucht. Es dürfte sich hierin wirklich ein Unterschied verspüren lassen, indem bei Einrei-

bungen mit Vaseline sich eine bedeutende Röthe und intensives Wärmegefühl entwickelt, in höherem Grade, als bei Einreibung mit Speck bei gleich großem Kraftaufwand der Fall ist.

Bei einer Frau, noch in jüngeren Jahren, erzeugte das Einreiben mit Vaseline, das täglich einmal vorgenommen wurde, anhaltende Röthe, so daß damit der Erfolg eines ausgedehnten Senfteiges erreicht wurde. Schon nach vier Tagen blieb die Röthe constant und wurden deshalb die Einreibungen sistirt.

Die günstigen Resultate gaben mir Veranlassung nun seit fast zwei Jahren alle diejenigen Hautkrankheiten, bei denen eine Salbe angezeigt erschien und wo zugleich die finanziellen Mittel des betreffenden Patienten die Anwendung des bis jetzt noch ziemlich theuern Vaseline gestatten, entweder mit reinem Vaseline oder in einer Mischung mit Carbol- oder Salicyl- und Bor säure, mit Jod und anderen Präparaten zu behandeln.

Dabei kamen Salben in Verwendung, die entweder frisch zubereitet waren oder auch solche, die schon längere Zeit (bis zu einem halben Jahre) aufbewahrt wurden. Sowohl reines Vaseline wie verschiedene Mischungen mit demselben waren viele Monate lang aufbewahrt, der Luft ausgesetzt und verschiedenen Temperaturen unterworfen, ohne daß sich ein Geruch oder eine Zersetzung desselben auch nur im geringsten wahrnehmen ließe. Dieser Umstand dürfte dem Vaseline seinen großen Werth und eminenten Vorzug vor den anderen Fetten verleihen.

Seine außerordentliche Haltbarkeit liegt nun zweifelsohne in dem Umstand, daß es aus mineralischen Bestandtheilen gewonnen wird und aus unveränderlichen Kohlenwasserstoffen besteht. Alle bis jetzt gebrauchten Fette und fetten Öle sind vegetabilischen oder animalischen Ursprunges, als fett saure Glycerylverbindungen sind sie zur Zersetzung in hohem Grade geneigt, indem sich unter den schädlichen Einflüssen der Luft und bei nur geringen Temperaturunterschieden Fettsäuren entwickeln. Man ist nun nicht im Stande, diese Fettsäurebildung gänzlich hintanzuhalten und auch auf chemischem Wege oder

durch Waschen und Auslaugen ist es nicht möglich, das Fett vollständig wieder zu reinigen.

Aber nicht bloß diese feine große Widerstandsfähigkeit gegen alle zeretzenden Einflüsse macht es so werthvoll, auch seine zähe, äußerst dehnbare Beschaffenheit ist nicht zu unterschätzen; gerade in den Fällen wo die Haut vor der Luft und schädlichen Einwirkungen geschützt werden soll, bietet das Vaseline wie kein anderes Fett, eine vortrefflich schützende Decke. Diese werthvollen Eigenschaften müssen entschieden veranlassen, daß das Vaseline die ausgebreitetste Anwendung finde auch in der Chirurgie, in der Geburtshilfe und Gynaekologie.

Zu chirurgischen Zwecken verwendet wird es nach zwei Seiten hin von großem Nutzen sein, sowohl für den Operateur wie für den Operirten.

Nachdem heut zu Tage fast bei allen Operationen die Carbol säure eine Hauptrolle spielt, so ist auch erklärlich, daß Operateure, die viel mit dieser Säure zu schaffen haben, Schrunden an den Händen bekommen und nicht selten beträchtliche Gefühllosigkeit, die Sicherheit beim Schneiden beeinträchtigt. — Dieses lästige Uebel wird nun bestimmt beseitigt werden können, wenn die Theile, die mit der ätzenden Säure in Berührung kommen, nach der gründlichen Reinigung zuerst mit Vaseline bestrichen sind. Durch seine bedeutende zähe Cohäsion bildet es einen äußerst dichten Ueberzug über die Epidermis und verhindert dadurch die Einwirkung auf die Haut. Was nun die Nützlichkeit für den Operirten betrifft, so dürfte dieselbe sicherlich unbefritten sein. Es gibt nämlich sehr viele Krankheitsfälle und Operationen, namentlich auf dem Lande, wo es eine absolute Unmöglichkeit ist eine Wunde mit den Lister'schen Cautelen zu behandeln. In solchen Fällen erweist sich nun von großem Werth das Carbol-Vaseline etwa in der Mischung von 1 : 5. Ist eine Wunde mit der größten Sorgfalt gereinigt und zum

Verbinden fertig gestellt, so wird eine Heilung mit Carbol-säure in überraschend kurzer Zeit erreicht. Wenn auch nicht geläugnet werden kann, daß die Verbandmethode nach Lister von eminentem Nutzen und Vortheil namentlich in Spitalern sich erweist, so wird es doch, gerade auf dem Lande, wo der Arzt oft sehr weit entfernt ist, eine Reihe von Fällen geben, wo diese bessere Verbandmethode nicht Platz greifen kann. In allen diesen Fällen nun dürfte die Anwendung von Vaseline mit Carbolsäure in der angegebenen Mischung einen nicht zu unterschätzenden Ersatz bilden. Es dürfte so ziemlich ausgemachte Thatfache sein, daß die Desinfectionsfähigkeit des Carbol-Vaseline eine viel länger dauernde ist, als die der desinfizierten Gasverbände. Da es nun unbestreitbar Fälle gibt, in denen absolut nicht nach Listers Vorschrift verbunden werden kann, und es gerade darauf ankommt, das Sekret namentlich in der ersten Zeit nach der Operation aufs sorgfältigste vor den zersetzenden Bestandtheilen und Einflüssen der Luft zu schützen, so wird sich auch hiebei das Vaseline sehr empfehlen.

Auch in der Geburtshilfe ist es von großer Bedeutung ebenfalls in Verbindung mit Carbol- oder Salicylsäure. Seine Brauchbarkeit ist unleugbar sowohl bei einfachen Untersuchungen der Vagina als auch bei Operationen, bei Wendungen, beim Lösen der Placenta, bei denen der Arm grösstentheils eindringen muß. Sind nun diese Theile, die bei diesen Operationen, sowohl wie bei einfachen Untersuchungen in Aktion treten, mit Carbol- oder Salicyl-Vaseline nach vorhergegangener gründlicher Reinigung gut bestrichen und desinfiziert, so wird die Möglichkeit der Uebertragung von septischen Stoffen, die der Hand oder dem Arm an und für sich schon adhärent sind und noch gefährlicher wirkend werden, wenn septische Elemente einer Puerpera-Kranken sich vorfinden, in hohem Grade vermieden werden können. Bei den verschiedensten Gelegenheiten wird schliesslich noch das Vaseline von dem grössten Nutzen sein und seine Anwendung wird mit

der Zeit auch eine allgemeine werden sobald es nur gelingt, daselbe um billigeren Preis zu erwerben. Es werden nun in neuerer Zeit verschiedene sogenannte Erd-Oel-Präparate hergestellt, denen ebenfalls der Name Vaseline aufgestempelt ist, oder auch solche, die unter einem andern Namen kursiren. Versuche, welche damit angestellt wurden, zeigen einen verschiedenartigen Werth und nicht immer gleich gute Brauchbarkeit. Jetzt dürften die vorzüglichen oben besprochenen Eigenschaften wohl dem neuesten fabrizirten Vaseline von Hellfrisch zukommen. Es gibt nämlich mehrere Präparate die in Deutschland oder England hergestellt sind, welche die große Dauerhaftigkeit des ächten deutschen Virginia-Vaselines nicht besitzen; dieselben nehmen vielmehr, wenn sie öfter erwärmt und wieder kalt werden, einen stinkenden Geruch an und scheinen den zersetzenden Einflüssen nicht immer Widerstand leisten zu können.

Die gegenwärtig hauptsächlich in Gebrauch stehenden Arten von Vaseline sind das amerikanische Produkt und das deutsche Fabrikat von Offenbach am Main. Diese beiden bieten einige Unterschiede. Das Raffiniren dieser Sorten dürfte es sein, was den Hauptunterschied erzeugt.

Das amerikanische Vaseline ist von dunkelgelber Farbe nicht so konsistent wie das deutsche von Hellfrisch. Dieses ist heller gelb, zeigt etwas mehr Festigkeit. Auf die Zunge gebracht löst das Letztere gar keinen Geschmack erkennen, während das amerikanische entschieden wenn auch nur schwach den Petroleumgeschmack bietet. Namentlich neben verschiedenen Abweichungen, ist es das Verhalten zu Sauerstoff, was dem Mineralfett den Werth verleiht. Während das amerikanische Vaseline leicht sehr viel Sauerstoff absorbirt, nimmt das Virginia-Vaseline von Hellfrisch in gleicher Quantität nur den siebenten Theil Sauerstoff auf. Eine Aetherlösung mit ersterem reagirt deutlich fauer, eine solche Lösung mit letzterem reagirt kaum erkennbar fauer.

Schließlich dürfte die Verbefferung des Fabrikats dieser

Erdöl-Präparate keineswegs als geschlossen betrachtet werden, es sollte vielmehr noch gelingen, daselbe farblos herzustellen, und um billigeren Preis beschaffen zu können; erst dann wird es möglich sein das Vaseline allgemein zur Anwendung zu bringen und dann wird man auch in der Lage sein, seine große Vorzüglichkeit vor den animalischen und vegetabilischen Fetten und Oelen mit heilsamem Nutzen ausbeuten zu können.
